
НИИ гриппа
им. А.А. Смородинцева

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПНЕВМОВИРУСНЫМ (РСВ и МПВ) ИНФЕКЦИЯМ

за 43 неделю 2026 года. (19.10.26 - 25.10.26)

На 43 неделе 2026 года по данным еженедельного ПЦР-мониторинга из 32 городов (Астрахань, Белгород, Биробиджан, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Норильск, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск, Самара, Симферополь, Смоленск, Санкт-Петербург НИИ Гриппа, Сыктывкар, Тула, Улан-Удэ, Ульяновск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск), расположенных в 7 Федеральных округах, ситуация по **респираторно-синцитиальному вирусу (РСВ) и метапневмовирусу (МПВ)** в России оставалась благополучной.


Рис.1. Мониторинг респираторно-синцитиальной вирусной (РСВ) и метапневмовирусной (МПВ) инфекции у больных ОРВИ в городах России



В целом, по данным еженедельного ПЦР-мониторинга за период с 40 недели 2026 года по 43 неделю 2026 года РСВ был выявлен во все недели. В среднем частота диагностирования РС-вируса составила **0,1%**. Максимальная частота детекции РС-вирусной инфекции была зарегистрирована на 43 неделе 2026 года, составив **0,2%** от числа обследованных больных.


С 40 недели 2026 года по 43 неделю 2026 года МПВ был выявлен во все недели. В среднем частота диагностирования МПВ составила **0,09%**. Максимальная частота детекции МПВ инфекции была зарегистрирована на 43 неделе 2026 года, составив **0,1%** от числа обследованных больных.

Рис.2. Мониторинг респираторно-синцитиальной вирусной (РСВ) инфекции у больных ОРВИ отдельных возрастных групп в городах России




Мониторинг результатов ПЦР-диагностики РСВ инфекции в отдельных возрастных группах больных показал, что на 43 неделе 2026 года на РСВ обследовано 6606 больных. Из них в возрастной группе 0-2 лет - 1188, 3-6 лет - 935, 7-14 лет - 1160, 15 лет и старше - 3323. Выявлено 15 (**0,2%**) случаев **РСВ** инфекции, в том числе 6 (0,5%) случаев у детей в возрасте 0-2 года, 2 (0,2%) случая у дошкольников в возрасте 3-6 лет, 3 (0,3%) случая у школьников в возрасте 7-14 лет и 4 (0,1%) случая у больных возрастной группы 15 лет и старше.

Рис.3. Мониторинг метапневмовирусной (МПВ) инфекции у больных ОРВИ отдельных возрастных групп в городах России



Мониторинг результатов ПЦР-диагностики МПВ инфекции в отдельных возрастных группах больных показал, что на 43 неделе 2026 года на МПВ обследовано 6606 больных. Из них в возрастной группе 0-2 лет - 1188, 3-6 лет - 935, 7-14 лет - 1160, 15 лет и старше - 3323. Выявлено 7 (**0,1%**) случаев **МПВ** инфекции, в том числе 2 (0,2%) случая у детей в возрасте 0-2 года, 1 (0,09%) случай у школьника в возрасте 7-14 лет и 4 (0,1%) случая у больных возрастной группы 15 лет и старше.

Рис. 4. Суммарная частота диагностирования респираторно-синцитиальной вирусной (РСВ) и метапневмовирусной (МПВ) инфекции в отдельных возрастных группах больных за период с 40 недели 2026 года по 43 неделю 2026 года



В целом, с 40 по 43 неделю 2026 года на РСВ и МПВ обследовано 25333 больных в том числе 4231 ребёнок в возрасте 0-2 года, 3551 дошкольник 3-6 лет, 4109 школьников 7-14 лет и 13442 взрослых больных в возрасте 15 лет и старше.

РСВ, как причину ОРВИ, чаще регистрировали в возрастной группе 0-2 года. Суммарная частота диагностирования у детей в возрасте 0-2 года составила **0,3%** от числа обследованных больных возрастной группы. У детей в возрасте 3-6 лет РСВ был выявлен в **0,1%** случаев, у школьников 7-14 лет – в **0,1%**. У взрослых больных возрастной группы 15 лет и старше РСВ был диагностирован у **0,1%** больных.

МПВ, как причину ОРВИ, чаще регистрировали в возрастной группе 0-2 года и 7-14 лет. Суммарная частота диагностирования у детей в возрасте 0-2 года составила **0,1%** от числа обследованных больных возрастной группы. У детей в возрасте 3-6 лет РСВ был выявлен в **0,06%** случаев, у школьников 7-14 лет – в **0,1%**. У взрослых больных возрастной группы 15 лет и старше РСВ был диагностирован у **0,07%** больных.